可以提供更多有关左室整体及局部的定量分析信息。目前国内尚无关于TTS应变的相关报道,国外也仅见个例报道^[6-8]。本例患者入院第1天GLS -11.2%,牛眼图显示心尖段收缩期峰值应变显著减低,Sosa和Banchs^[6]研究认为急性期心尖段应变显著减低是TTS的特征性表现,有助于其早期诊断。本例患者入院后第7天LVEF 55%,GLS -12.2%,牛眼图显示心尖段应变较前恢复,中间段应变显著减低,推测可能与心肌细胞儿茶酚胺梯度变化有关。与Chattopadhyay和John^[9]报道的1例TTS表现相似。尽管心室收缩功能快速恢复是TTS的标志,但其恢复时间仍未明确,本例患者出院后3个月复诊时GLS同步心电图显示患者左室功能完全恢复,或可为临床诊治提供参考。

总之,TTS合并左室血栓临床罕见,心肌声学造影可早期明确左室血栓,指导临床治疗决策;超声心动图能早期诊断TTS,并动态观察TTS恢复过程,具有较好的临床价值。

参考文献

- [1] Ghadri JR, Wittstein IS, Prasad A, et al. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic Criteria, and Pathophysiology[J]. Eur Heart J, 2018, 39(22):2032-2046.
- [2] Pelliccia F, Kaski JC, Crea F, et al. Pathophysiology of Takotsubo syndrome[J]. Circulation, 2017, 135(24):2426-2441.

- [3] 尹洪宁,王岳恒,郝国贞,等.应激性心肌病合并左室内血栓超声表现1例[J].中华超声影像学杂志,2014,23(4):364-365.
- [4] 王立娜,雷警输,赵伟,等.应激性心肌病心室内血栓一例[J].中国心血管杂志,2021,26(3):285-289.
- [5] Ding KJ, Cammann VL, Szawan KA, et al. Intraventricular thrombus formation and embolism in Takotsubo syndrome: insights from the international takotsubo registry[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2020, 40(1):279-287.
- [6] Sosa S, Banchs J. Early recognition of apical ballooning syndrome by global longitudinal strain using speckle tracking imaging—the evil eye pattern, a case series[J]. Echocardiography, 2015, 32(7):1184-1192.
- [7] Albenque G, Bohbot Y, Delpierre Q, et al. Basal Takotsubo syndrome with transient severe mitral regurgitation caused by drug use: a case report[J]. Eur Heart J Case Rep, 2020, 4(2):1-6.
- [8] Lee M. Time course of functional recovery in Takotsubo (stress) cardiomyopathy: a serial speckle tracking echocardiography and electrocardiography study[J]. J Cardiovasc Imaging, 2020, 28(1):50-60.
- [9] Chattopadhyay S, John J. Tako-Tsubo and reverse Tako-Tsubo cardiomyopathy: temporal evolution of The same disease? [J]. Eur Heart J, 2009, 30(23):2837.

(收稿日期:2023-06-20)

· 病例报道 ·

Echocardiographic manifestations of pulmonary artery trunk leiomyosarcoma: a case report

肺动脉干平滑肌肉瘤超声心动图表现1例

王冬灵 景香香

[中图法分类号]R540.45

[文献标识码]B

患者女,45岁,自诉胸闷、胸痛、气促3个月,加重2周,偶出现晕厥,无夜间端坐呼吸、咯血、腹胀、四肢水肿,外院超声心动图提示心脏扩大,对症治疗效果欠佳,现来我院就诊。超声心动图检查:右房左右径51 mm,右室左右径46 mm,肺动脉主干内见一大小约57 mm×30 mm不均质团状低回声,边界尚清晰,形态规则,活动度可,舒张期可见部分瘤体脱向右室流出道(图1);CDFI于其内未探及明显血流信号(图2);连续多普勒示肺动脉干峰值流速489 cm/s,压差96 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),见图3;三尖瓣口收缩期见反流血流信号到达右房中部,峰值流速471 cm/s,压差89 mmHg。超声心动图提示:①右心扩大;②肺动脉主干内团状低回声,考虑黏液瘤可能性大;③三尖瓣中度反流。门诊以肺动脉肿瘤收入院,体格检查:心浊音界扩大,心

率78次/min,肿瘤标志物检查未见明显异常;患者既往无冠心病、高血压及肿瘤治疗史。左心声学造影检查:肺动脉团状低回声内造影剂稀疏灌注,右室流出道内膜边缘及心肌显示清晰(图4),提示黏液瘤可能。遂行全麻下肺动脉肿瘤切除术、右室流出道疏通+肺动脉瓣成形术,术中见升主动脉明显扩张,跨环切开主肺动脉,见一大小约60 mm×40 mm的带包膜肿瘤,与肺动脉瓣粘连,游离肿瘤见蒂样组织(图5)。术后病理检查:光镜下见梭形瘤细胞呈束状、交织状排列,细胞核异形明显,核分裂多,间质黏液样变性,局部坏死(图6);免疫组化检查:Desmin(+),S-100(弱+),CD34(-),SMA(+),CD117(弱+),Dog-1(+),Vim(+),CD99(+),CK(-),CD31(弱+),Ki-67(30%+),Myogenin(-),MyoD1(灶+)。病理诊断:间叶来源的恶

图1 超声心动图示肺动脉主干内见一不均质团状低回声,边界尚清晰,几乎填充肺动脉主干(箭头示)

图2 CDFI于不均质团状低回声内未探及明显血流信号

图3 连续多普勒示肺动脉主干峰值流速489 cm/s,压差96 mmHg

图4 左心声学造影示低回声内造影剂稀疏灌注,右室流出道内膜边缘及心肌显示清晰

图5 平滑肌肉瘤大体图

图6 病理图示梭形瘤细胞呈束状、交织状排列,细胞核异形明显,核分裂多,间质黏液样变性,局部坏死(HE染色,×400)

性肿瘤,结合免疫组化检查结果确诊为平滑肌肉瘤。患者术后半年复查超声心动图未见复发。

讨论:平滑肌肉瘤是来源于平滑肌的恶性间质肿瘤,临床较少见,常见发病部位为腹部、盆腔及腹膜后等富含平滑肌的组织器官^[1]。源于肺动脉内的平滑肌肉瘤罕见,其是原发于肺动脉壁肌层的恶性肿瘤,好发于肺动脉主干,也可见于左、右肺动脉分支及右室流出道,易发生邻近淋巴结或远处淋巴结及其他脏器转移,预后较差^[2]。目前肺动脉平滑肌肉瘤发病机制尚未明确,由于肺动脉阻塞会引起右室功能障碍、肺动脉高压、肺功能不全等,临床多表现为呼吸困难、胸痛、咳嗽、气促,易误诊为肺栓塞。本例患者临床表现为胸闷、胸痛、气促,偶出现突发晕厥,由于肿瘤引起肺动脉狭窄致阻力增加、右室射血障碍,肺循环血流减少,右室后负荷增加,与肺动脉血栓表现相似,而患者既往无肿瘤治疗史,完善相关检查未发现其他部位恶性病变,肿瘤标志物未见明显异常,考虑肿瘤原发于肺动脉主干。

文献^[1,3]报道,肺动脉平滑肌肉瘤超声表现为不均质团状低回声,边界欠清晰,有蒂,其内未探及明显血流信号;本例患者超声表现与上述报道相似,但肺动脉干未完全闭塞,肿瘤可随心动周期摆动,舒张期见部分瘤体进入右室流出道,类似于黏液瘤表现。左心声学造影具有实时动态成像、无辐射等优点,可以反映组织的血流灌注情况。本例患者肿瘤大部分呈充盈缺损,仅见造影剂稀疏灌注,表现为少血供,分析原因可能为

平滑肌肉瘤恶性程度高,生长速度快,导致瘤体较大、组织内部坏死成分较多,呈片状无增强,因此误诊为黏液瘤。肺动脉平滑肌肉瘤需与肺动脉黏液瘤及肺动脉血栓鉴别诊断:①肺动脉黏液瘤多呈均匀低回声,形态较规则,有蒂样组织,瘤体运动幅度取决于蒂长短,超声造影呈低增强模式;②肺动脉血栓多表现为边界尚清晰,内部回声较均匀,形态不规则,无蒂,固定于血管腔内,未随血流运动而活动,超声造影可见充盈缺损。

总之,超声心动图可以准确定位并显示肺动脉肿瘤血流情况,明确其与周围组织结构关系,评估心室功能障碍及肺动脉狭窄程度等,是平滑肌肉瘤的首选检查方法。本病最终确诊仍依靠组织病理检查。

参考文献

- [1] 唐艳云,刘舜辉,肖莉莉,等.巨大盆腔平滑肌肉瘤超声表现1例[J].中国临床医学影像杂志,2022,33(12):910-911.
- [2] Lv Y, Wang F, Qian W, et al. Treatment of a recurrent pulmonary artery leiomyosarcoma with a combination of surgery, chemotherapy, and radiotherapy: a case report and literature review [J]. Oncol Lett, 2015, 9(4): 1545-1548.
- [3] Modi K, Dhillon S, Kumar A, et al. Leiomyosarcoma of the pulmonary artery diagnosed by endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration [J]. Endosc Ultrasound, 2014, 3(4): 249-251.

(收稿日期:2023-01-26)