超声引导下射频消融联合泡沫硬化剂治疗不同管径大隐静脉曲张的临床价值

曾欣 周洋 叶鸣 王弼偲 陈芮 汤雪瑶 周鸿

摘要 **目的** 探讨超声引导下射频消融联合泡沫硬化剂治疗不同管径大隐静脉曲张及超声在术后短期疗效评估中的临床价值。**方法** 选取我院收治的大隐静脉曲张患者 145 例(145 条患肢),根据术前超声测量大隐静脉大腿段最大管径分为 A 组(管径 <10 mm)98 例和 B 组(管径 ≥ 10 mm)47 例,两组均采用超声引导下腔内射频消融闭合大隐静脉主干和注射泡沫硬化剂治疗小腿曲张浅静脉。比较两组消融次数和术后即刻、1 个月、6 个月大隐静脉闭塞率、残留管径、汇入口残留长度,以及术后并发症发生情况。**结果** B 组每节段平均消融次数大于 A 组,差异有统计学意义($P<0.05$)。A 组、B 组术后即刻大隐静脉闭塞率均为 100%,术后 1 个月分别为 97.96%、100%,术后 6 个月分别为 95.92%、95.74%,两组各时间点大隐静脉闭塞率比较差异均无统计学意义。术后 1 个月、6 个月 B 组大隐静脉残留管径均大于 A 组,差异均有统计学意义(均 $P<0.05$)。两组患者术后均未出现深静脉血栓、肺栓塞等严重并发症,出现皮下瘀斑和皮肤灼伤占比比较差异均无统计学意义;B 组出现皮下条索僵硬静脉占比大于 A 组,差异有统计学意义($P<0.05$)。**结论** 超声引导下射频消融联合泡沫硬化剂治疗不同管径大隐静脉曲张后短期内大隐静脉闭塞率较高,但较大管径的大隐静脉可能需要更多的消融周期;超声在术中引导及监测、术后随访和疗效评估中均有重要的临床价值。

关键词 超声引导;射频消融;大隐静脉曲张;管径

[中图分类号]R445.1;R543.6

[文献标识码]A

Clinical value of ultrasound-guided radiofrequency ablation combined with foam sclerosing agent in the treatment of varicose great saphenous vein with different diameters

ZENG Xin, ZHOU Yang, YE Ming, WANG Bisi, CHEN Rui, TANG Xueyao, ZHOU Hong

Department of Ultrasound, the Third People's Hospital of Chengdu, Chengdu 610000, China

ABSTRACT **Objective** To explore the clinical value of ultrasound-guided radiofrequency ablation combined with foam sclerosing agent in the treatment of varicose great saphenous vein with different diameters and ultrasound in the short-term efficacy evaluation after operation. **Methods** A total of 145 patients (145 affected limbs) with varicose great saphenous vein in our hospital were selected and divided into group A (diameter <10 mm, $n=98$) and group B (diameter ≥ 10 mm, $n=47$) according to the preoperative ultrasound measurement of the maximum diameter of the thigh segment of the great saphenous vein. Both groups were treated by ultrasound-guided intracavitary radiofrequency ablation to close the trunk of the great saphenous vein and injection of foam sclerosing agent to treat superficial varicose veins of the lower leg. The ablation times, the occlusion rate of great saphenous vein immediately, 1 month, and 6 months after surgery, the residual lumen diameter and length, the postoperative complications were compared between the two groups. **Results** The average ablation time of each segment in group B was higher than that in group A, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). The immediate occlusion rates of the great saphenous vein in group A and group B were 100%, and the occlusion rates of the great saphenous vein 1 month after surgery were 97.96% and 100%, 6 months after surgery were 95.92% and 95.74%, respectively. There were significant difference in the

occlusion rate of great saphenous vein between the two groups (both $P<0.05$). The residual diameter of great saphenous vein in group B was larger than that in group A at 1 month and 6 months after surgery, and the differences were statistically significant (both $P<0.05$). There were no severe complications such as deep vein thrombosis and pulmonary embolism occurred in the two groups after surgery, and there were no significant difference in the proportion of subcutaneous ecchymosis and skin burns between the two groups. The proportion of subcutaneous cord stiffness veins in group B was higher than that in group A, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). **Conclusion** Ultrasound-guided radiofrequency ablation combined with foam sclerosing agent has a high occlusion rate of great saphenous vein in the short term in the treatment of varices great saphenous vein with different diameters, but the larger diameter of the great saphenous vein may need more ablation cycles. Ultrasound has important clinical value in intraoperative monitoring, postoperative follow-up and curative effect evaluation.

KEY WORDS Ultrasound guidance; Radiofrequency ablation; Varicose great saphenous vein; Diameter

大隐静脉曲张临床较常见,成人静脉曲张的发病率为 20%~64%^[1]。超声引导下射频消融已在部分地区替代外科高位结扎和剥离手术,成为治疗大隐静脉曲张的首选方法^[2]。超声能清晰显示大隐静脉的宽度、走行、结构及瓣膜,并实时评估血流动力学情况,在术前诊断大隐静脉曲张、术中引导射频消融及术后疗效评估中均有重要的作用^[3]。既往研究^[4-5]主要探讨射频消融治疗大隐静脉曲张的优势,较少涉及消融不同管径大隐静脉曲张术后疗效的比较。本研究旨在探讨超声引导下射频消融联合泡沫硬化剂治疗不同管径大隐静脉曲张及超声在术后短期疗效评估中的应用价值。

资料与方法

一、研究对象

选取 2021 年 1 月至 2022 年 12 月我院血管外科收治的大隐静脉曲张患者 145 例(共 145 条患肢),男 84 例,女 61 例,年龄 34~85 岁,平均(59.7±12.5)岁。根据术前超声测得大隐静脉大腿段最大管径分为 A 组(管径<10 mm)98 例和 B 组(管径≥10 mm)47 例。均采用超声引导下腔内射频消融闭合大隐静脉主干和注射泡沫硬化剂治疗小腿曲张浅静脉。纳入标准:①年龄>18 岁;②临床诊断为大隐静脉曲张;③超声提示患肢大隐静脉大腿段管径>3 mm,股隐静脉瓣功能不全,反流时间>0.5 s;④髂静脉、下肢深静脉通畅。排除标准:①患肢急性深静脉血栓或浅静脉血栓形成、深静脉系统发育不全、血管畸形;②患肢股隐静脉交界处瘤样扩张(内径>20 mm);③妊娠或哺乳;④有严重凝血功能障碍;⑤全身严重疾病不能耐受手术者;⑥对硬化剂过敏者。本研究经我院医学伦理委员会批准(伦理号:2023-S-8),所有患者及家属均知情同意。

二、仪器与方法

1. 仪器:超声检查及超声引导使用迈瑞 M 6 便携式彩色多普勒超声诊断仪,7L4S 线阵探头,频率 8~11 MHz;射频主机为 Closure RFG3 静脉腔内射频闭合发生器(美国 Covidien 公司),射频导管使用 ClosureFast 射频导管(美国 Medtronic 公司)。

2. 术前超声检查:术前对所有患者行下肢静脉超声检查。患者取仰卧位,保持大腿外旋,常规扫查股静脉、股浅静脉、腘静脉、大隐静脉、小隐静脉,观察其走行及管壁有无血栓形成;于大隐静脉大腿段最宽处测量并记录管径,并在股隐静脉瓣进行 Valsava 试验,应用彩色多普勒及频谱多普勒观察静脉管腔内血流反流情况;然后扫查并标记与大隐静脉相通的交通支静脉及小腿曲张的浅静脉。

3. 超声引导下射频消融和泡沫硬化剂治疗:患者取仰卧位,常规碘伏术区消毒,铺无菌巾,对穿刺点进行局部麻醉,于超声引导下在膝关节以下 5 cm 处采用穿刺针刺入大隐静脉主干,肝素化盐水冲洗导管和导管鞘,置入导丝,撤出穿刺针,置入 7F 导管鞘,经导管鞘置入 ClosureFast 射频导管,待超声检查确认导管进入大隐静脉主干且头端置于距大隐静脉汇入口 2 cm 处,固定导管。于超声引导下沿大隐静脉主干周围分段向隐筋膜间隙内注入适量麻醉肿胀液(由肾上腺素 0.5 mg、2%利多卡因 25 ml、碳酸氢钠 10 ml 及 0.9%生理盐水 465 ml 配置而成),当纵切面观察到大隐静脉被压闭,横切面观察到大隐静脉被包绕,以确保麻醉肿胀液能完全包裹压闭的大隐静脉。待麻醉肿胀液注射完毕,再次复查超声确定射频导管位置后开始射频消融,由近心段向远心段逐段闭合大隐静脉主干,射频导管能量最高温度为 120℃,治疗有效长度为 7 cm,每 20 s 为 1 个治疗周期。射频消融过程中应用超声实时监测,消融大隐静脉汇入口 2 cm 处时可适量加压探头,使导管与血管壁充分接触,并观察射频导

管上是否产生气体样强回声伴彗星尾征,避免热量传播灼伤股总静脉。每个节段常规加热治疗1~2个周期,若大隐静脉主干管径较大,消融后静脉塌陷欠佳,可酌情追加治疗1个周期。在1个治疗循环结束后,快速回撤导管至下一处标记位置进行下一次治疗。术后即刻复查超声了解大隐静脉主干闭合情况,确定大隐静脉主干闭合后,撤出射频导管,局部压迫止血。然后于超声引导下于小腿曲张静脉团处行多点穿刺,注射泡沫硬化剂(聚多卡醇注射液3%,国药准字:HJ20160034)1 ml,待超声观察到静脉管腔内见云雾状稍强回声充填,提示药物注入,然后行局部压迫。确认病变静脉治疗成功后,予伤口处覆盖纱布,使用绷带对所治疗下肢进行加压包扎。

4. 术后疗效评估:术后1、6个月定期复查超声,测量大隐静脉汇入口残留长度、大隐静脉残留管径,并计算大隐静脉闭塞率。闭塞定义为射频消融后大隐静脉主干内未探及血流信号;再通定义为射频消融后大隐静脉主干内探及血流信号,其中存在长度>5 cm 静脉节段探及血流信号为完全再通,存在长度≤5 cm 静脉节段

探及血流信号为部分再通^[6]。

5. 一般资料收集及术后随访:术前根据下肢静脉曲张临床表现、病因学因素、解剖定位和病理生理改变(CEAP)分级^[7]评估静脉曲张临床严重程度。收集患者年龄、性别、手术患肢部位、手术时间、住院时间、CEAP分级、消融大隐静脉长度、每节段平均消融次数等。术后随访并发症发生情况,包括皮肤灼伤、皮下瘀斑、硬结、感染、邻近神经损伤、静脉炎、深静脉血栓及肺动脉栓塞等。

三、统计学处理

应用SPSS 23.0统计软件,符合正态分布的计量资料以 $\bar{x}\pm s$ 表示,采用 t 检验;不符合正态分布的计量资料以 $M(Q_1, Q_3)$ 表示,采用Mann-Whitney U 检验。计数资料以例或率表示,采用 χ^2 检验或Fisher确切概率法。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

术前超声检查、术中超声引导及监测、术后超声随访见图1~6。

图1 术前超声检查见曲张的大隐静脉

图2 超声引导下将麻醉肿胀液注入筋膜间隙使其压闭包裹大隐静脉

图3 射频消融过程中超声实时监测导管上产生气体样强回声伴彗星尾征

图4 射频消融后即刻超声示大隐静脉管壁增厚,管腔变窄,腔内透声差

图5 射频消融后即刻超声复查大隐静脉主干全段,CDFI示未探及血流信号

图6 射频消融后即刻超声测量大隐静脉汇入口残留长度

一、两组一般资料、超声参数、术中情况比较
两组年龄、性别、手术患肢部位、手术时间、住院时间、CEAP分级、消融大隐静脉长度等比较,差异均无统计学意义。两组大隐静脉管径及每节段平均消

融次数比较,差异均有统计学意义(均 $P<0.05$)。见表1。

二、两组术后超声随访情况

两组消融术后即刻超声扫查提示所有消融的大

表 1 两组一般资料、超声参数、术中情况比较

组别	年龄 (岁)	男性 (例)	左侧患肢 (例)	手术时间 (min)	住院时间 (d)	CEAP 分级(例)					大隐静脉管径 (mm)	消融大隐静脉 长度(cm)	每节段平均消融 次数(次)
						C2	C3	C4	C5	C6			
A 组(98)	59.7±12.9	57	52	30.5±4.6	6.8±2.3	50	33	10	4	1	5.3(5.0, 6.5)	37.2±3.3	2.2(2.0, 2.2)
B 组(47)	59.8±11.6	27	29	31.7±6.5	7.4±2.4	17	20	6	3	1	12.5(11.5, 14.0)	38.2±2.9	3.0(3.0, 3.2)
<i>t/Z</i> χ ² 值	-0.024	0.007	0.962	-1.102	-1.406			3.633			-9.735	-1.734	-8.993
<i>P</i> 值	0.981	0.935	0.327	0.274	0.162			0.455			0.001	0.085	0.001

CEAP: 临床表现、病因学因素、解剖定位和病理生理改变

隐静脉均全段闭合, 闭塞率均为 100%。术后 1、6 个月复查超声, 两组大隐静脉管壁均增厚, 其内可见低弱回声充填, 均未发现完全再通的大隐静脉。A 组术后 1 个月随访见 2 例部分再通, 管腔内可见稀疏点状血流信号, 术后 6 个月随访见 4 例部分再通; B 组术后 1 个月随访未发现部分再通, 术后 6 个月见 2 例部分再通。

两组术后 1 个月、6 个月大隐静脉闭塞率比较 (97.96% vs. 100%、95.92% vs. 95.74%), 差异均无统计学意义 (*P*=0.326、0.961)。术后 1 个月、6 个月两组大隐静脉汇入口残留长度比较差异均无统计学意义; B 组大隐静脉残留管径均大于 A 组 (均 *P*<0.05)。见表 2。

表 2 两组术后 1 个月、6 个月超声参数比较 mm

组别	大隐静脉残留管径		大隐静脉汇入口残留长度	
	术后 1 个月	术后 6 个月	术后 1 个月	术后 6 个月
A 组(98)	2.5(2.2, 3.0)	2.2(1.8, 2.5)	9.6±2.1	9.3±2.3
B 组(47)	3.8(3.3, 4.2)	3.0(2.9, 3.4)	9.8±2.4	9.5±1.4
<i>t/Z</i> 值	-6.145	-4.786	-0.475	-0.379
<i>P</i> 值	0.001	0.001	0.636	0.705

三、两组术后并发症比较

两组术后均未出现深静脉血栓、肺栓塞等严重并发症, 其中 A 组出现皮下条索僵硬静脉 2 例、皮下瘀斑 2 例、皮肤灼伤 1 例, B 组出现皮下条索僵硬静脉 7 例、皮下瘀斑 1 例、皮肤灼伤 1 例。B 组出现皮下条索僵硬静脉占比大于 A 组, 差异有统计学意义 (*P*<0.05); 两组其余术后并发症发生比较差异均无统计学意义。

讨 论

下肢大隐静脉曲张早期可表现为轻微疼痛、疲劳感、瘙痒、湿疹等, 长期未治疗会引起更严重的皮肤变色和腿部溃疡等。超声引导下射频消融在局部麻醉下完成, 患者术后即可离床活动, 同时具备无切口、恢复快、手术时间短、并发症少等优点, 目前已在部分地区替代外科高位结扎和剥离手术, 成为治疗大隐静脉曲张的首选方法^[2]。射频消融的原理为通过导管产生

的热能作用于静脉血管壁的内膜及胶原纤维, 引起静脉壁损伤、管腔挛缩和塌陷, 最终机化后形成纤维条索使静脉闭合^[8]。本研究旨在探讨超声引导下射频消融联合泡沫硬化剂治疗不同管径大隐静脉曲张及超声在术后短期随访中的应用价值。

以往大隐静脉管径是射频消融的限制之一, 有研究^[5]认为射频导管发挥其作用的前提是必须与静脉壁直接接触, 而在管径≥10 mm 的大隐静脉曲张中, 二者直接接触较困难, 因此采用射频消融治疗管径≥10 mm 的大隐静脉曲张后早期即可观察到较高的再通率。本研究于超声引导下将麻醉肿胀液注入隐筋膜间隙, 不仅具有麻醉、镇痛、散热的作用, 同时能将软组织及神经纤维向周围推开, 避免消融时被灼伤, 其次还可以完全压闭曲张的大隐静脉, 使其与导管完全贴合, 更好地消融。Woo 等^[9]对管径>12 mm 的大隐静脉曲张进行射频消融, 术后随访显示大隐静脉闭塞率高达 98%, 但该研究未分析不同管径大隐静脉与射频消融次数的关系。本研究结果显示, 两组年龄、性别、手术时间、住院时间、CEAP 分级、消融大隐静脉长度等比较差异均无统计学意义, 而 B 组术中每节段平均消融次数多于 A 组, 差异有统计学意义 (*P*<0.05), 表明消融管径≥10 mm 的大隐静脉曲张较管径<10 mm 者可能需要更多的消融周期。且术后超声随访显示, 两组均未发现完全再通病例, 仅有少量部分再通病例; 两组术后 1 个月、6 个月大隐静脉闭塞率均较高且差异均无统计学意义。Nyamekye 等^[10]认为射频消融能有效治疗管径>8 mm 的大隐静脉曲张, 但与管径≤8 mm 的大隐静脉曲张相比, 消融管径越粗可能越需要额外的能量输送, 而射频消融仪 1 个周期所产生的能量是固定的, 若要输出额外的能量传递, 可通过重复治疗实现。研究^[11]认为消融治疗管径≥10 mm 的大隐静脉曲张时, 静脉收缩需要更长的时间, 增加射频能量可以加快收缩时间, 从而提高射频消融的治疗效率, 这也解释了本研究结果中 B 组每节段平均消融次数多于 A 组的原因。

本研究中两组术后均未出现深静脉血栓、肺栓塞等严重并发症,其中A组出现皮下条索僵硬静脉2例、皮下瘀斑2例、皮肤灼伤1例;B组出现皮下条索僵硬静脉7例、皮下瘀斑1例、皮肤灼伤1例。表明射频消融后并发症少见且轻微。深静脉血栓形成是射频消融术后主要严重不良事件^[12],本研究中所有患者均未发生。B组皮下条索僵硬静脉占比大于A组,且术后1个月、6个月B组大隐静脉残留管径均大于A组(均 $P<0.05$),分析可能为术前大隐静脉管径越粗,术后残留管径也相对较粗,其内实变、纤维化、钙化,形成条索僵硬静脉概率也越大。本研究B组每节段平均消融次数多于A组,但两组仅出现少量皮下瘀斑和皮肤灼伤等轻微并发症,表明适当增加消融次数并不会增加深静脉血栓、肺栓塞、皮下瘀斑等并发症的风险。术中超声引导对避免这些并发症也发挥了至关重要的作用,不仅能够有效精准引导麻醉肿胀液注入隐筋膜间隙完全包裹大隐静脉,保护周围皮肤软组织、神经不被高温灼伤,还可以术中实时监测大隐静脉主干闭合效果及有无损伤股总静脉;而术前超声能清晰显示大隐静脉解剖学形态、走行并反映瓣膜功能等,还可以评估下肢深静脉血栓,对手术适应证进行有效筛选;术后超声定期随访能安全、便捷、直观地对大隐静脉闭塞情况进行准确评估。

综上所述,超声引导下射频消融联合泡沫硬化剂治疗不同管径大隐静脉曲张后短期内大隐静脉闭塞率较高,但较大管径的大隐静脉可能需要更多的消融周期;超声在术中引导及监测、术后随访和疗效评估中均有重要的临床价值。但本研究仅对术后闭塞率进行了短期(6个月内)随访,其远期疗效有待进一步随访观察。

参考文献

[1] Wittens C, Davies AH, Bækgaard N, et al. Editor's Choice—Management of Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS)[J].

- Eur J Vasc Endovasc Surg, 2015, 49(6):678–737.
- [2] Rasmussen L, Lawaetz M, Serup J, et al. Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation, radiofrequency ablation, foam sclerotherapy, and surgical stripping for great saphenous varicose veins with 3-year follow-up[J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2013, 1(4):349–356.
- [3] 杨淑君,李礼,罗鸿昌.大隐静脉主干射频消融治疗中的性别差异及彩色多普勒血管成像应用[J].分子影像学杂志,2020,43(1):25–30.
- [4] 金冲,冯一浮,肖春莹,等.超声实时监测射频腔内闭合联合点式剥脱治疗大隐静脉曲张[J].中国微创外科杂志,2018,18(6):528–530.
- [5] Kemaloglu C. Saphenous vein diameter is a single risk factor for early recanalization after endothermal ablation of incompetent great saphenous vein[J]. Vascular, 2019, 27(5):537–541.
- [6] Bendix SD, Peterson EL, Kabbani LS, et al. Effect of endovenous ablation assessment stratified by great saphenous vein size, gender, clinical severity, and patient-reported outcomes [J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2021, 9(1):128–136.
- [7] Lurie F, Passman M, Meisner M, et al. The 2020 update of the CEAP classification system and reporting standards [J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2020, 8(3):342–352.
- [8] Zhai Y, Lu YM, Lu W, et al. Radiofrequency ablation of the great saphenous vein in the treatment of varicose veins of the lower extremities [J]. Ann Ital Chir, 2022, 93(2):235–240.
- [9] Woo HY, Kim SM, Kim D, et al. Outcome of ClosureFAST radiofrequency ablation for large-diameter incompetent great saphenous vein [J]. Ann Surg Treat Res, 2019, 96(6):313–318.
- [10] Nyamekye IK, Dattani N, Hayes W, et al. A randomised controlled trial comparing three different radiofrequency technologies: short-term results of the 3-RF trial [J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2019, 58(3):401–408.
- [11] García-Madrid C, Pastor Manrique JO, Sánchez VA, et al. Endovenous radiofrequency ablation (venefit procedure): impact of different energy rates on great saphenous vein shrinkage [J]. Ann Vasc Surg, 2013, 27(3):314–321.
- [12] Lomazzi C, Grassi V, Segreti S, et al. Pre-operative color Doppler ultrasonography predicts endovenous heat induced thrombosis after endovenous radiofrequency ablation [J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2018, 56(1):94–100.

(收稿日期:2023-02-25)